


Herkenning van Ambrosia




Een eenvoudig hulpmiddel om de drie Ambrosiasoorten te onderscheiden van andere soorten

Soort	Blad (Voor alle soorten 5 tot 20+ cm groot)	Stengel (Alle soorten 20 tot >100cm groot)	Bloemen
Alsemambrosia <i>(Ambrosia artemisiifolia)</i> uitheems	 <p>Meestal <u>tegenoverstaand</u> (vooral onderaan), Onderkant grijsgroen, Meestal dubbelveerdig, Duidelijk behaard en gesteeld, Gave rand</p>	 <p>Vrij sterk behaard, Vertakt, Hoekig, Vaak eerst groen later roodbruin</p>	 <p>3-5mm, man: <u>groengele aarvormige trossen bovenin de plant</u>, vr: onopvallend in bladoksels onderin bloeiwijze, <i>Bloei: sep-okt</i></p>

Driedelige ambrosia (*A. trifida*) - uitheems - Verschil t.o.v. Alsemambrosia: 3- (tot 5) spletig blad.

Zandambrosia (*A. psilostachya*) - uitheems - Verschil t.o.v. Alsemambrosia: kortgesteeld of zittend blad (enkelveerdig) en kruipende wortelstokken.

Bijvoet <i>(Artemisia vulgaris)</i> inheems	 <p>Meestal <u>verspreidstaand</u>, <u>Onderkant witviltig</u>, Enkel- of dubbelveerdig, Vrijwel kaal, Bovenste blad duidelijke oortjes, Gave rand</p>	 <p>Vrijwel kaal, Sterk vertakt, <u>Breed mergkanaal</u>, Soms rood- tot paarsachtig</p>	 <p>3-4mm in rijk vertakte bebladerde pluimen, Eivormig, <u>Eerst (licht)gelig later roodbruin</u>, <i>Bloei: jul-sep</i></p>
--	--	---	---

Boerenwormkruid <i>(Tanacetum vulgare)</i> inheems	 <p>Meestal <u>verspreidstaand</u>, Donkergroen, Enkelvoudig (en gelijkmatig) veerdig, Bovenste blad niet gesteeld, <u>Grofgezaagde rand</u></p>	 <p>Vrijwel kaal, Onvertakt (m.u.v. bloeiwijze), <u>Vezelig</u>, Donkergroen (soms rode) stengel, Plant in forse pollen</p>	 <p>Bloemhoofdjes 7-12mm in <u>schermvormige bloeiwijze</u>, (Fel) <u>Geel gekleurd</u>, <i>Bloei: jul-sep</i></p>
---	---	---	---

Phacelia <i>(Phacelia tanacetifolia)</i> uitheems	 <p><u>Verspreidstaand</u>, Enkel- of dubbelveerdig of veerdig, Ruw behaard, <u>Getand of gelobde bladrand</u></p>	 <p>Naar boven toe kort behaard met <u>daartussen langere borstels</u> (haren), Vertakt, Groene tot paarsrode stengel</p>	 <p><u>Blaauwe</u> (evt. roze of witte) <u>klokvormige bloemen</u>, 10-15mm, In een schicht (opgerolde aarvormige bloeiwijze), <i>Bloei: mei-sep</i></p>
--	---	---	---

Foto's: Adrie van Heerden, Bert Verbruggen, Peter Meiningen & Willem Braam

Bladstand:



Alsemambrosia, **Zandambrosia** en **Driedelige ambrosia** zijn uitheemse soorten die onbedoeld Nederland zijn binnengekomen, o.a. via vogelvoer. Dit is een probleem omdat het stuifmeel (pollen) van deze soorten sterke hooikoortsklachten veroorzaakt. Alsemambrosia komt het meest voor en bloeit laat, als bijna alle andere hooikoortspollen niet meer bloeien. Daarmee kan de soort het hooikoortsseizoen met 2 maanden verlengen! Omdat het zaad van de plant 40 jaar kiemkrachtig kan blijven, is het van belang om direct te melden als je deze soort tegenkomt, liefst voordat hij zaad zet. Dan is de plant nog goed te verwijderen. De folder is opgesteld door FLORON in opdracht van de NVWA. Meer informatie over Ambrosia (incl. beheeropties): www.ambrosiavrij.nu of over invasieve exoten in het algemeen: www.tuinernietin.nl