

Het vegetatiebeeld verklaard

Ton Denters, Niels Eimers & Stef van Walsum

Een nadere vegetatiekundige beschouwing volgt nog; een publicatie is voorzien in het tijdschrift De Levende Natuur. De historische groeiplaatsen en het nieuwe Amsterdamse onderkomen van Geel cypergras lijken erg verschillend, maar wie vegetatiekundig kijkt, ziet de overeenkomsten. In deze link alvast een preview, met vegetatieopname en een eerste duiding.

De vegetatieopname in Park Somerlust toont een samengaan van tredplanten met elementen uit het Dwergbiezen-gemeenschappen; een combinatie van het *Plantagini-Lolietum*, het *Nanocyperion flavescens* en het bijhorende *Isolepido-Stellarietum*. De moslaag is daarbij aansluitend. Een bijzondere positie is er voor de tredbestendige Getande weegbree, typisch voor het *Isolepido-Stellarietum*. Een vergelijkbare vertoning is er voor Tengere rus, waarvan bekend is dat deze binnen het *Nanocyperion flavescens* een 'Juncus tenuis-stadium' kan innemen.

Vegetatieopname (Braun-Blanquet-methode)	
Geel cypergras Somerlust, Amsterdam	
Denters / Eimers / Van Walsum, 31-10-2025	
Opnamevlak 4 x 4 m (122.963-483.767) Totale bedekking: 96 % / moslaag 5-10 % Hoogte: gem. 5 cm, max. 10 cm.	
* Soorten uit oorspronkelijke 'speelgazonmengsel'	
Geel cypergras 3 / geschat 20.000 exx.	Rood zwenkgras 2a *
Tengere rus 2a	Ruw beemdgras 2a *
Getande weegbree 2b	Engels raaigras 1 *
Zomprus 1	Geknikte vossenstaart 1
Greppelrus +	Straatgras +
Valse voszegge +	Gestreepte witbol +
Witte klaver 2b	Moerassikkelmos 2m
Madeliefje +	Gekroesd plakkaatmos 2m
Paardenbloem +	Gewoon pluisdraadmos 2m
	Gewoon puntmos 2m
	Gewoon dikkopmos +
	Gewoon purpersteeltje +
	Kleismaragdstieltje +